





1. Junte su equipo.



2. Empuje el tapón con el pulgar para enganchar el medicamento en polvo con la solución en el frasco.



3. Mezclar el polvo y la solución, no agitar el frasco, mover suavemente de forma circular o mecer el frasco de un lado a otro, lo que permite mezclarlo por completo.



4. Retire la "pestaña" amarilla en la parte superior del frasco.



5. Limpie la parte superior del frasco con una toallita de alcohol.



6. Abra el paquete y saque la jeringa con aguja.



7. Inyectar aire de un tercio a la mitad de la jeringa. Ponga la aguja/jeringa completamente a través del tapón de goma. Invierta el frasco y ponga suavemente el aire de la jeringa.



8. Tire suavemente del émbolo de la jeringa y retire todo el medicamento. Vuelva a colocar la tapa suavemente sobre la jeringa y retire las burbujas de aire "tocando" el lado de la jeringa.



9. Identifique un lugar de inyección en el "tercer" medio en la parte externa del muslo.



10. Limpie el sitio con una toallita de alcohol antes de inyectarse.



11. Sostenga el sitio tenso, y sosteniendo la jeringa similar a un dardo, empuje la aguja en el músculo a un ángulo de 90 grados. La aguja debe ser empujada al menos 3/4 de su longitud.

12. Con una mano en la jeringa, utilice la otra mano para tirar ligeramente hacia atrás en el émbolo para asegurarse de que no ve ninguna sangre en la jeringa. SI VE sangre en la jeringa, retire suavemente la aguja ligeramente y ajuste el ángulo. Empuje la aguja hacia atrás en 3/4 del camino.

13. Una vez completada la inyección, retire la jeringa/aguja rápidamente y aplique presión en el lugar de la inyección y aplique un curita en el sitio, si es necesario.

#### Precauciones adicionales:

SI VE sangre en la jeringa, se prefiere extraer la aguja del muslo y preparar una jeringa nueva y otra Act-O-Vial. Si no tiene una jeringa nueva o un segundo Act-O-Vial, suavemente saque la aguja ligeramente, y ajuste su ángulo y proceda con la inyección.